


عفونت دستگاه ادراری



بیمارستان طالقانی

PICU

Pediatric Intensive Care Unit

منبع

پرستاری کودکان مارلو

رژیم غذایی

دادن مایعات فراوان به کودک جهت
رقیق شدن ادرار



دادن داروهای تجویز شده به طور کامل



پرهیز از غذاهای محرک و ادویه دار



دادن استراحت کافی به کودک



پوشک کودک زود تعویض و حتی
الامکان خشک نگه داشته شود



در صورت بی قراری کودک، اشکال در
ادرار کردن، احساس بوی بد ادرار به
پزشک مراجعه نماید.

داروهای تجویز شده توسط پزشک از
نظر (دوز، زمان، مقدار) را به طور
کامل اجرا نمایید.



عفونت دستگاه ادراری

این عفونت شایعترین بیماری ادراری - تناسلی در دوران کودکی می باشد در نوزادان به صورت اختلال در رشد ، مشکلات تغذیه ای ، اسهال ، استفراغ و تب در شیر خواران ، سوزش و تکرار ادرار، درد در هنگام ادرار کردن و درد پهلوی و شکم بروز می کند.

آموزش به والدین :

اکثر کودکان مبتلا در منزل مورد مراقبت قرار می گیرند و پیش از شروع درمان، دادن نمونه ادرار جهت کشت لازم است .

رعایت بهداشت در شیر خواران. و کودکان خردسال (مونث) به اینصورت است که پس از دفع ادرار مسیر حرکت حوله کاغذی باید از سمت جلو به سمت عقب انجام گیرد.

این کار از ورود ارگانیسمها از سوراخ مجرای ادراری و پیشروی به سمت بالا پیشگیری می کند.

در کودکان مذکر که ختنه نشده است پوست حشفه باید حتی امکان تمیز نگهداری شود.

هنگام حمام کردن حتی الامکان از وان استفاده نشود .به جای وان از دوش استفاده شود.

به جای استفاده از شورتهای پلاستیکی از شورتهای پنبه ای استفاده شود.



در صورتی که کودک برای استفاده از لگن تعلیم یافته است باید توصیه شود از نگهداری ادرار در مثانه خودداری کرده و حداقل ۴ بار در روز باید مثانه به طور کامل تخلیه گردد.

نوزادان پسر به موقع ختنه شوند.



استفاده از لباسهای نخی و آزاد توصیه می شود.

از پوشاندن البسه تنگ و بستن محکم پوشک خودداری کنید . و از شلوار پنبه ای استفاده نمائید.



جهت جمع آوری نمونه ادرار محل ادرار را کاملاً شسته و قسمت اول ادرار را دور ریخته و از ادرار وسط نمونه بگیرد.