

## تعیین و مقایسه سطح سرمی ایمنوگلبولین‌ها

### در معتادان به تریاک و مشتقات آن و افراد سالم غیرمعتاد

دکتر سید محمود قریشیان<sup>\*</sup>، دکتر محمد رضا شریفی<sup>۲</sup>

چکیده

مقدمه و هدف: اعتیاد اساس اجتماع و شالوده خانواده‌ها را تهدید به فنا و سقوط می‌کند و هستی ملت‌ها را به خاک و خاکستر تبدیل می‌سازد و زیان‌های مادی و معنوی و خسارات جانی فراوانی در پی دارد و افراد معتاد حساس به عفونت‌ها و دارای مقاومت کم هستند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ایمنوگلبولین‌ها در معتادان به تریاک و مشتقات آن و مقایسه با افراد غیرمعتاد که هیچ‌گونه مواد مخدر و دخانیات مصرف نمی‌کنند، می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق مورد - شاهدی از ۱۵۰ فرد معتاد و ۱۵۰ فرد سالم همسن و هم جنس از هر کدام ۵ سی‌سی خون گرفته و سپس سرم آنرا جدا نموده و مقدار ایمنوگلبولین M و ایمنوگلبولین G و ایمنوگلبولین A آنها به روش SRID اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: میانگین IgM در افراد غیرمعتاد  $109/5 \pm 47/28$  mg/dl بود ( $P < 0.05$ ). میانگین IgG افراد معتاد  $123/8 \pm 32/85$  mg/dl و در افراد غیرمعتاد  $100/8 \pm 35/4/38$  mg/dl بود ( $P < 0.05$ ).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که میانگین مقدار IgG و IgM در افراد معتاد نسبت به افراد غیرمعتاد به طور معنی‌داری کمتر بود که با مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده هم خوانی دارد.

واژه‌های کلیدی: معتاد، تریاک، ایمنوگلبولین

\* - استادیار ایمنولوژی، گروه پاتوبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد

نشانی: یزد، دانشکده پزشکی شهید صدوقی، تلفاکس: ۸۲۲۹۵۰۰، پست الکترونیک: smghoraishian@hotmail.com

۲ - استادیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی یزد

ایمنوگلبولین‌ها و یا واکسن انجام نداده‌اند و هیچ نوع بیماری سیستمیک و روحی روانی و عفونت حاد و یا مزمن نداشته‌اند به روش نمونه‌گیری آسان یعنی انتخاب متواتی به عنوان گروه مورد وارد مطالعه گردید. همچنین از ۱۵۰ فرد سالم هم سن و هم جنس با روش Matching که جهت طرح سلامت به آزمایشگاه مرکزی یزد مراجعه کرده بودند، به عنوان شاهد انتخاب شدند. از افراد فوق ۵ سی سی خون وریدی توسط کارشناس آزمایشگاه گرفته و پرسشنامه در رابطه با سن، نوع اعتیاد، مدت اعتیاد و میزان تحصیلات تکمیل شد. سپس خون گرفته شده به آزمایشگاه مرکزی یزد منتقل شد و با سانتریفوژ کردن سرم هر فرد جدا نموده و در لوله جداگانه‌ای ریخته و اتیکت روی لوله گذاشته و سرم‌ها در فریزر در دمای منهای ۸۰ درجه سانتی گراد گذاشته و هر هفته مقدار ایمنوگلبولین‌های سرم‌ها را به روش انتشار ایمنی شعاعی یکطره<sup>۱</sup> با میکروپلیت‌هایی که از شرکت بیوژن<sup>۲</sup> مشهد خریداری شده بود، اندازه‌گیری شد. اساس این روش مبتنی بر تشکیل یک رسوب قابل رویت حاصل از واکنش بین IgG و آنتی‌بادی اختصاصی یا IgM و آنتی‌بادی اختصاصی یا IgA و آنتی‌بادی اختصاصی با نسبت‌های مناسب و روش اندازه گیری طبق بروشور موجود در کیت می‌باشد. روش SRID روشی ساده و رایج است که در تمام آزمایشگاه‌های ایران انجام می‌شود و قادر است  $10 \text{ ug/ml}$  از آنتی‌بادی را اندازه گیری کند و اختصاصی بودن آن ۹۵ درصد می‌باشد. ولی روش ELISA هم وجود دارد که دارای حساسیت بالایی می‌باشد ولی در ایران کیت آن ساخته نمی‌شود و کیت‌های وارداتی دارای هزینه زیاد می‌باشند و در این تحقیق از SRID به عنوان گلگ استاندارد استفاده شده است.

اطلاعات در محیط نرم افزار SPSS به کامپیوتر وارد شده و به منظور مقایسه‌ها و آزمون‌های آماری از آزمون‌های تی و کای‌اسکوئر استفاده گردیده است. ضریب اطمینان مطالعه ۹۵ درصد  $\alpha = 0.05$ .

### یافته‌ها

به طور کلی ۳۰۰ نمونه سرم شامل ۱۵۰ نفر معتاد (مورد) و ۱۵۰ نفر غیرمعتاد به عنوان شاهد مقدار IgM، IgG و IgA اندازه گیری شد. از لحاظ جنس از ۱۵۰ فرد معتاد ۱۴۹ نفر آنها مرد و یک نفر زن بود (۹۹/۳۳) درصد مرد و ۰/۶۷ درصد

### مقدمه

اعتیاد داستان تلحیخ زندگی انسان‌ها است که خود را پای آتش پیر می‌سازند و در جهنم تحذیر می‌سوزانند. قدمت استفاده بشر از تریاک به هزاران سال قبل رسید. این روند استفاده از مواد افیونی که با یک سیر صعودی همراه بوده، منجر به معضل اجتماعی شده است که اساس اجتماع و شالوده خانواده‌ها را تهدید به فنا و سقوط می‌کند و هستی ملت‌ها را به خاک و خاکستر تبدیل می‌سازد و زیان‌های مادی و معنوی و خسارات جانی فراوانی در پی دارد.

آمار نشان می‌دهد که هزینه اقتصادی ناشی از اعتیاد (اعم از مر芬، الکل، سیگار و ...) بالغ بر ۲۳۰ میلیون دلار می‌باشد (۱). همین گزارش حاکی از این است که یک چهارم از دومیلیون مرگ سالانه در آمریکا و یک‌چهارم تا یک‌سوم خودکشی و بزه‌های سنگین و یک‌سوم میزان ازدواج‌های ناموفق به نوعی مربوط به مصرف مواد اعتیادآور می‌باشد (۱). مطالعات نشان می‌دهد که ۲۵-۹۰ درصد بچه‌های خیابانی در آمریکا حداقل یک نوع ماده مخدر استعمال می‌کنند و به علت حس کنجکاوی و هویت‌یابی انسان در دوران نوجوانی نوجوانان مستعد برای ابتلاء به مواد مخدر می‌باشند و افرادی که برای آنها اتفاقات ناگوار رخ داده مستعد هستند مثل فقر، از هم پاشیدگی خانواده، تعییض و بی‌خانمان بودن (۲).

در حیوانات آزمایشگاهی نشان داده‌اند که ۲ ساعت بعد از تزریق  $30 \text{ mg/kg}$  مر芬 تکثیر لنفوسيت‌های خون به میزان ۸۵ درصد کاهش یافته است (۳-۵). همچنین نشان داده‌اند که مر芬 ایمونوساپرسیو می‌باشد و باعث کاهش ایمنوگلبولین‌ها و افزایش عفونت در موش‌ها می‌شود و حساسیت به عفونت‌های دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد (۶) و مشاهده می‌کنیم که افراد معتاد به تریاک و مشتقات آن دائمًا جهت مداوای عفونت به پزشکان مراجعه می‌کنند. با توجه به مطالب گفته شده هدف از این تحقیق بررسی میزان ایمنوگلبولین‌ها در معتادان به تریاک و مشتقات آن و مقایسه با افراد غیرمعتاد که هیچ گونه مواد مخدر و دخانیات مصرف نمی‌کند، می‌باشد.

### مواد و روش‌ها

این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به صورت مورد - شاهدی انجام شد. از ۱۵۰ فرد معتاد که به مرکز خودمعرف بهزیستی یزد یا بیمارستان شهید بهشتی جهت ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند و در ۴ ماه گذشته تزریق

<sup>1</sup> SRID

<sup>2</sup> Biogene

۱۶۰۰ mg/dl و بین ۶۰۰-۱۶۰۰ mg/dl و بیشتر از ۶۰۰ mg/dl می باشد ، معنی دار است ( $P<0.05$ ). ولی وضعیت IgA در دو گروه مورد بررسی در حد طبیعی بود.

جدول ۲ : توزیع فراوانی وضعیت IgM در دو گروه مورد بررسی

جمع	بیشتر از ۲۰۰ mg/dl	۶۰۰ تا ۲۰۰ mg/dl	کمتر از ۶۰ mg/dl	IgM		گروه
				تعداد درصد	غیرمعتاد	
۱۵۰	۱	۱۴۹	۰	تعداد درصد	غیرمعتاد	۱۵۰ نفر
۱۰۰	۷	۹۹/۳	۰			
۱۵۰	۱۰	۱۰۹	۳۱	تعداد درصد	معتاد	۱۵۰ نفر
۱۰۰	۶/۶	۷۲/۲	۲۱/۲			
۳۰۰	۱۱	۲۵۸	۳۱	تعداد درصد	جمع	۱۵۰ نفر
۱۰۰	۳/۷	۸۶	۱۰/۳			

$P<0.05$

جدول ۳ : توزیع فراوانی وضعیت IgG در دو گروه مورد بررسی

جمع	بیشتر از ۱۶۰۰ mg/dl	۱۶۰۰ تا ۱۶۰۰ mg/dl	کمتر از ۱۶۰۰ mg/dl	IgG		گروه
				تعداد درصد	غیرمعتاد	
۱۵۰	۱۳	۱۳۵	۲	تعداد درصد	معتاد	۱۵۰ نفر
۱۰۰	۸/۷	۱۹/۹	۱/۳			
۱۵۰	۱	۱۰۱	۴۱	تعداد درصد	معتاد	۱۵۰ نفر
۱۰۰	۷	۶۸/۵	۳۱/۱			
۳۰۰	۱۴	۲۳۶	۵۰	تعداد درصد	جمع	۱۵۰ نفر
۱۰۰	۴/۷	۷۱/۶	۱۶/۷			

$P<0.05$

## بحث

در مطالعه حاضر ۱۵۰ فرد معتاد با ۱۵۰ فرد غیرمعتاد از نظر آنتی بادی ها مورد بررسی قرار گرفتند و همان طور که مشاهده کردیم ۹۹/۳۳ درصد افراد معتاد مردان بودند و بیشترین افراد معتاد سن آنها بین ۳۰-۳۹ سال (۳۴ درصد) و بین ۲۰-۲۹ سال (۴۰/۶ درصد) بود. بیشترین افراد معتاد دارای دیپلم (۴۳/۳ درصد) بودند و شاید یکی از مسائل مهم که افراد به این کار روی می آورند مسأله بیکاری در جامعه می باشد و افرادی باشند که پس از گرفتن دیپلم نتوانسته اند ادامه تحصیل بدنهند. ۸۲ درصد افراد معتاد از تریاک استفاده می کردند و همان طور که در مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان داده شده است (۲) ، ۲۵-۹۰ درصد بچه های خیابانی در آمریکا از یک نوع ماده مخدر استفاده می کردند و به علت حسن

زن). از ۱۵۰ نفر معتاد ۳۴ درصد سن آنها بین ۲۰-۲۹ سال ، ۴۰/۶ درصد سن آنها بین ۳۰-۳۹ سال ، ۲۱/۴ درصد سن آنها بین ۴۰-۴۹ سال و ۴ درصد سن آنها بین ۵۰-۵۹ سال بود.

۱۵۰ نفر معتاد ۱۲۳ نفر (۸۲ درصد) از تریاک ، ۷ نفر (۷/۶ درصد) از شیره و تریاک ، ۷ نفر (۷/۴ درصد) از شیره و تریاک (۴/۴ درصد) از هروئین استفاده می کردند.

۱۵۰ نفر معتاد ۴۳ نفر (۲۸/۶ درصد) بین ۱-۵ سال ، ۶۵ نفر (۴۳/۴ درصد) بین ۶-۱۰ سال ، ۲۶ نفر (۱۷/۴ درصد) بین ۱۱-۱۵ سال و ۱۶ نفر (۱۶ درصد) بین ۱۶-۲۰ سال از تریاک و یا مشتقات آن استفاده می کردند.

۱۵۰ نفر معتاد ۳۲ نفر (۲۱/۳ درصد) تحصیلات ابتدایی ، ۴۴ نفر (۲۹/۴ درصد) تحصیلات سیکل ، ۶۵ نفر (۴۳/۳ درصد) دیپلم و ۹ نفر (۶ درصد) دارای لیسانس و فوق لیسانس بودند.

جدول ۱ میانگین ایمنو گلبولین های IgA، IgG، IgM را در دو گروه موردنظر که مشاهده می شود تفاوت IgM بین افراد معتاد و غیرمعتاد معنی دار است ( $P<0.05$ ) و تفاوت IgG بین افراد معتاد و غیرمعتاد معنی دار است ( $P<0.05$ ) و تفاوت IgA بین افراد معتاد و غیرمعتاد نیز معنی دار می باشد ( $P<0.05$ ).

جدول ۱ : میانگین ایمنو گلبولین ها در دو گروه مورد بررسی  
mg/dl بر حسب

* P-value	SD	میانگین	جامعه مورد بررسی	نوع ایمنو گلبولین
۰/۰۵	۳۲/۱۵	۱۲۳/۱	غیرمعتاد	IgM
	۴۷/۲۸	۱۰۹/۵	معتاد	
۰/۰۵	۲۹۱/۰۷	۱۳۰۷/۲	غیرمعتاد	IgG
	۳۵۴/۳۱	۱۰۰۱/۶	معتاد	
۰/۰۵	۵۳/۶۴	۲۰۱/۵	غیرمعتاد	IgA
	۶۳/۶	۱۸۷/۶	معتاد	

T-test \*

جدول ۲ توزیع فراوانی وضعیت IgM را در دو گروه مورد بررسی نشان می دهد و همان طور که مشاهده می شود تفاوت مقدار IgM در افراد معتاد نسبت به غیرمعتاد که بین ۶۰-۲۰۰ mg/dl می باشد ، معنی دار است ( $P<0.05$ ).

جدول ۳ توزیع فراوانی وضعیت IgG در دو گروه مورد بررسی را نشان می دهد و همان طور که ملاحظه می شود تفاوت مقدار IgG در افراد معتاد نسبت به غیرمعتاد که کمتر از

همچنین در این مطالعه که مقدار IgG و IgM در افراد معتاد نسبت به افراد غیرمعتمد به طور معنی‌داری کمتر از حد طبیعی می‌باشد ( $P<0.05$ ) که این با مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده است همخوانی دارد (عواید ۱۲-۱۵). در پایان نتیجه گیری می‌شود با مطالعه ما و مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده است ایمنوگلوبولین‌های IgG و IgM در افراد معتاد به تریاک کاهش می‌باشد.

### تشکر و قدردانی

از معاونت محترم پیشگیری اداره بهزیستی و همچنین از خانم فیروزه شفیعی و آقایان سلیم نژاد و فرهاد بهران به خاطر همکاری در اجرای این طرح قدردانی می‌شود.

- 1) Golds. MS. Clinical Aspects in substance. A comprehensive text book. 2nd ed. Baltemaoe. Williams and Willins. 1992; PP:205-220.
- 2) WHO information fact sheet N1S1. Substance use Among street children. March 1997.
- 3) Mellon RD, Bayer BM. Reversal of acute effects of high dose morphine on lymphocyte activity by chlorisondamine. Drug Alcohol Depend. 2001; 62(2): 141-7
- 4) Coussons ME, Dykstra LA, Lysle DT. Pavlovian conditioning of morphine-induced alterations of immune status. J Neuroimmunol. 1992; 39: 219- 230.
- 5) Lysle DT, Coussons ME, Watts VJ, Bennett EH, Dykstra LA. Morphine-induced alterations of immune status: dose dependency, compartment specificity and antagonism by naltrexone. J Pharmacol Exp Ther. 1993; 265(3):1071-8.
- 6) West JP, Dykstra LA, Lysle DT. Immunomodulatory effects of morphine withdrawal in the rat are time dependent and reversible by clonidine. Psychopharmacology (Berl). 1999; 146(3): 320-7.
- 7) Fecho Kandlysls DT. Phenotypic analysis of spenocyte substance following acute morphine treatment in Rat. Cellular. Immunology 1999; 195; 137-146.
- 8) Bayer BM, Daussin S, Hernandez M, Irvin L. Morphine inhibition of lymphocyte activity is mediated by an opioid dependent mechanism. Neuropharmacology. 1990;29(4): 369-74.
- 9) Bayer BM. Distinctin between. The in vitro and in

کنجدکاوی و هویت یابی انسان در دوران نوجوانی نوجوانان مستعد برای ابتلا به مواد مخدر می‌باشند. در این مطالعه تفاوت میانگین IgG و IgA در افراد معتاد نسبت به افراد غیرمعتمد معنی‌دار بود ( $P<0.05$ ). در حیوانات آزمایشگاهی نشان داده‌اند که بعد از تزریق مرفین تکثیر لنفوسيت‌ها به میزان ۸۵ درصد کاهش یافته است (عواید ۷ و ۴) و از فعالیت لنفوسيت‌ها جلوگیری می‌کنند (۱۰-۸). همچنین نشان داده‌اند که مرفین ایمونوساپرسیو می‌باشد و باعث کاهش ایمنوگلوبولین‌ها و افزایش عفونت در موش‌ها می‌شود و حساسیت به عفونت‌های دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد (عواید ۱۱).

### منابع

- vivo inhibitory effect of morphine on lymphocyte proliferation based on agonist selectivity and Maltrexone reversibility, Immunopharmacology. 1992; 2: 117- 124.
- 10) Bryant HU, Bernton EW, Holaday JW. Immunosuppressive effects of chronic morphine treatment in mice. Life Sci. 1987; 41(14):1731-8.
- 11) Eisenstein TK, Meissler JJ Jr, Bussiere JL, Rogers TJ, Geller EB, Adler MW. Mouse strain differences in in vivo and in vitro immunosuppressive effects of opioids. Adv Exp Med Biol. 1995; 373:115-21.
- 12) Radulovic J, Miljevic C, Djergovic D, Vujic V, Antic J, von Horsten S, Jankovic BD. Opioid receptor-mediated suppression of humoral immune response in vivo and in vitro: involvement of kappa opioid receptors. J Neuroimmunol. 1995; 57(1-2): 55-62.
- 13) Palm S, Lehzen S, Mignat C, Steinmann J, Leimenstoll G, Maier C. Does prolonged oral treatment with sustained-release morphine tablets influence immune function? Anesth Analg. 1998; 86(1):166-72.
- 14) Islam SK, Hossain KJ, Kamal M, Ahsan M. Serum immunoglobulins and white blood cells status of drug addicts: influence of illicit drugs and sex habit. Addict Biol. 2004; 9(1):27-33.
- 15) Alonzo NC, Bayer BM. Opioids, Immunology, and host defenses of intravenous drug abusers. Infect Dis Clin North Am. 2002; 16(3): 553- 69.